

Undersøgelse af passageforhold i æggeledeerne (HSU)

Formål

Formålet med HSU er at undersøge, om der er passage i dine æggeledere og skylle æggeledeerne igennem, så evt. "løse forhindringer" fjernes, hvorved passageforholdene bedres. Sædcellerne skal kunne passere ud i æggeledeerne og det befrugtede æg transporteres tilbage til livmoderen.

HSU foretages efter menstruationen og før ægløsningstidspunktet, hvor der ikke er risiko for graviditet. Dvs. du skal ringe til klinikken på din første menstruationsdag, så vi kan aftale en tid.

Der skal foreligge en negativ Klamydiapodning inden indgrebet.

Indgrebet

Indgrebet kan give forbigående menstruationslignende smerter. Tag evt. 1 g Paracetamol + evt. 400 mg Ipren ½ time inden indgrebet. Styrken af smerter afhænger af, om der er fri, nedsat eller ingen passage gennem æggeledeerne. I sidstnævnte tilfælde vil væsken hobe sig op i livmoderen og udvide denne, hvilket er årsagen til smerter.

Der føres et tyndt og blødt plastrør (kateter) gennem livmoderhalsen op i selve livmoderen. Ultralydsundersøgelsen foregår gennem skeden. Mens der skannes, sprøjtes lokalbedøvelse (Carbocain)/luft igennem kateteret. Væsken/luften løber ud igennem æggeledeerne. Man vil herved kunne vurdere, om der er fri passage i mindst en af æggeledeerne. I få tilfælde er det ikke muligt at se, om der er passage, og du vil blive henvist til kikkertundersøgelse på sygehuset.

Efter indgrebet

Efter undersøgelsen kan du bløde lidt, og lidt af det tilbageblevne vand kan løbe ud af skeden. Der er en lille risiko for infektion, men dette skønnes at være under 1 %.

Der kan forekomme smerter i maven og i skulderen. Dette forsvinder som regel i løbet af 1-2 timer men kan vare i op til 1 døgn. Om nødvendigt kan der tages smertestillende, f.eks. Paracetamol tabl. 500 mg, højst 2 tabl. hver 6. time. I tilfælde af vedvarende smerter, feber eller ildelugtende udflåd, skal klinikken eller vagtlægen kontaktes, da man i så fald skal mistænke infektion.

Svar på undersøgelsen

DU/I får umiddelbart, i forbindelse med undersøgelsen, resultatet at vide. Den videre behandling planlægges.