

Vandskanning

Hvorfor skal jeg vandskannes?

Undersøgelse af livmoderhulen foretages typisk, hvis du har kraftige menstruationer, og der er mistanke om polypper og/eller fibromer (muskelknuder) i livmoderhulen, samt til nærmere vurdering af livmoderslimhinden.

Hvordan foregår en vandskanning?

Der lægges et tyndt kateter op i livmoderhulen. Samtidig med ultralydsskanning sprøjtes lidt saltvand, ca. 3 ml., ind i livmoderhulen så der fås et nøjagtigt billede af slimhinderne og dermed evt. processer.

Kateret fjernes. Undersøgelsen varer ca. 5 minutter. Der lægges evt. lidt lokalbedøvelse i livmoderhalsen før undersøgelsen (sjældent nødvendigt).

Normale efterforløb

Undersøgelsen kan være forbundet med menstruationslignende smerter, og der kan forekomme lidt vandigt udflåd i timerne efter.

Komplikationer i efterforløbet

Der kan forekomme smerter i maven og i skulderen i op til 1 døgn. Dette skyldes, at der kan blive skyllet lidt blod ud i bughulen sammen med den anvendte væske.

Smerterne forsvinder som regel i løbet af 1-2 timer. Om nødvendigt kan der tages smertestillende, f.eks. Paracetamol tabl. 500 mg, højst 2 tabl. hver 6. time, evt. sammen med tabl. Ipren 200-400 mg.

Enkelte patienter kan få et svimmelhedsanfald, også kaldet et vasovagalt tilfælde. Vasovagale tilfælde er ufarlige, men kan give kvalme, svedtendens, bleghed og kortvarig besvimelse. Det skyldes at dit blodtryk falder, og at pulsen bliver langsom. Det går hurtigt væk og forsvinder, når du har hvilet lidt med hovedet lavt og benene løftet lidt.

I tilfælde af vedvarende smerter, ildelugtende/øget mængde udflåd og/eller feber skal Klinikken, egen læge eller vagtlægen kontaktes.