

## Keglesnit

Skal du ud at rejse op til 2 mdr. efter indgrebet, skal du kontakte dit forsikrings-selskab, da de muligvis vil have en forhåndsgodkendelse [www.sos.eu](http://www.sos.eu)

Indgrebet kan i de allerfleste tilfælde foregå ambulat.

Det første, der sker, er anlæggelse af lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen. De første par stik vil du kunne mærke. Herefter vil du ikke føle smerte. Du vil hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved dig, men smertesansen er bedøvet.

Med en el-slynge udskæres et lille kegleformet vævsstykke medinddragende celleforandringerne på livmoderhalsen. Dette tager mindre end 30 sekunder. Indgrebet tager i alt ca. 15 minutter. Kanten og evt. blødning stoppes umiddelbart herefter med brænding (koagulation af sårfladen) Efter indgrebet skal du vente ca. 15 minutter for at sikre, at du ikke bløder. Der vil som regel ikke være smerter, men hvis det skulle forekomme, kan man købe håndkøbsmedicin, f.eks. Paracetamol, evt. sammen med Ipren 200 mg, 1-2 stk.

De fleste kvinder mærker ikke noget. Tag evt. 2 tbl. Paracetamol 1 time inden indgrebet.

Alle med moderate og svære celleforandringer indberettes elektronisk til Sundhedsdata Styrelsen.

### **OBS!**

Da der anvendes strøm, sættes en selvklæbende elektrode på dit højre lår. Derfor beder vi dig om **IKKE** at smøre højre lår ind i creme.

Det er en god idé at lade vandet inden indgrebet, da du slapper bedre af, når din blære er tom.

Du anbefales at tage en ven eller veninde med, som kan følge dig hjem.

Efter indgrebet skal du tage den med ro et par dage og undgå tunge løft, løb og cykling. Hvis du har tungt arbejde, tilråder vi sygemelding 3-4 dage. Der vil være sparsom blødning og udflåd 2-3 uger efter indgrebet, og i den periode bør du undgå samleje uden kondom, tamponer, svømmebad, havvand og karbad for at undgå infektion. Efter 10-14 dage falder sårskorpen af, og der kan du forvente lidt frisk blødning.

Efter 4-6 uger er livmoderhalsen helet op, og området hvorfra keglen er fjernet, er dækket af en ny slimhinde.

### **Komplikationer**

Du bør kontakte klinikken/lægevagten i tilfælde af:

- Kraftigere blødning end normal menstruation
- Ildelugtende udflåd
- Feber og smerter

## **Vaccination mod HPV**

Du anbefales vaccination hos din egen læge. Er du medlem af "Danmark" gives tilskud på 50 %.

Du kan læse mere om vaccinationen hos Kræftens Bekæmpelse eller cancer.dk

## **Kontrol**

Ca. 4-6 uger efter indgrebet vil du kunne forvente svar på den mikroskopiske undersøgelse af vævet. Den videre kontrol afhænger af, om der er sundt væv hele vejen rundt om forandringerne eller ej. Hvis forandringerne er fjernet i sundt væv, skal du blot kontrolleres med celleprøve hos din egen læge efter 6 måneder, hvor der samtidigt laves en virus (HPV) test. Hvis forandringerne når ud til kanten af keglen, skal du kontrolleres hos os efter 6 måneder. Selvom forandringerne når kanten, er det sjældent nødvendigt med yderligere behandling, da de sidste restforandringer som regel er brændt væk ved slutningen af indgrebet. Det videre forløb afhænger af, om prøverne er normale og om der fortsat er virus (HPV) tilstede.

Indgrebet har ingen indflydelse på det seksuelle samliv og dine muligheder for opnåelse af og gennemførelse af graviditet. Der vil dog være en lille øget risiko for at føde for tidligt.

## **Myter om celleforandringer – er det arveligt?**

Nej, det er IKKE arveligt men skyldes smitte ved sex med HPV virus.

Kræftens Bekæmpelses pjece: **Celleforandringer**