

Frysebehandling af livmoderhalsen

Ved frysebehandling af livmoderhalsen foretages en overfladisk frysning af den yderste del af livmoderhalsen.

Hvad er formålet med frysebehandlingen

At mindske udflåd, hindre blødning ved samleje.

Inden frysebehandlingen

Du må ikke have menstruation, når du skal have en frysebehandling, så opdager du din menstruation ligger samtidigt med behandlingen, skal du melde afbud på tlf. 66138818.

1 time før du kommer til din behandling, anbefales du at tage du 2 tabl. Paracetamol + 2 tabl. Ipren á 200 mg.

Selve frysebehandlingen

Varer omkring 10 minutter og foregår i klinikken.

Behandlingen bliver udført ved, at en metalprobe anbringes på det "syge"/følsomme område, og der fryses med kvælstof 2 minutter, så optøning. Derefter vurderes det, om det er nødvendigt at fryse en gang mere.

Udover menstruationslignende smerter i underlivet er frysebehandlingen smertefri. Det er derfor ikke nødvendigt med bedøvelse.

Efter indgrebet

Du kan gå hjem umiddelbart efter behandlingen. Der kan komme en hedestigning ½ time efter indgrebet samt lettere menstruationslignende smerter. Rigeligt vanddigt, evt. ildelugtende udflåd i 2-3 uger er normalt. Ved smerter eller feber skal du kontakte klinikken eller egen læge.

Kontrol efter 6 uger.

Forholdsregler

Du bør undgå samleje, karbad, svømmehal, havbad og anvendelse af tamponer i 1-2 uger. Efterfølgende skal du bruge kondom ved samleje, så længe der er udflåd.